



Informiamo gli olivicoltori del territorio istriano sui punti prognostici è stata segnalata la presenta della seconda generazione della **mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*).

Consigliamo agli olivicoltori di effettuare il controllo dei loro uliveti e dei frutti. Nel caso in cui risultasse che più del 5% dei frutti siano infettati, consigliamo di procedere con le misure di difesa preventive.

Tra le misure preventive va citato il metodo delle esche avvelenate, ovvero il **trattamento di parte della chioma dell'albero.**

A tal fine, può venir usato il prodotto dal nome **Success bait** (periodo di carenza di 14 giorni).

Tale metodo prevede di trattare solo parti della chioma o solo determinati rami, specialmente quelli con meno frutti. Il trattamento va ripetuto ogni 10-15 giorni e obbligatoriamente dopo la pioggia.

Se i frutti sono infetti per il 10-15%, allora va applicato il metodo curativo, che comprende il trattamento dell'intera chioma.

I prodotti che possono venir usati sono a base di **deltametrina** (Decis 2,5, Decis 100 EC, Poleci plus , Scatto , Rotor super), a base di **fosmet** (Imidan 50 WG) e di **dimetoato** (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor)..

Avviso agli olivicoltori!

Categoria: Comunicati

Publicato: Martedì, 27 Agosto 2019 17:40

Scritto da JUO

Visite: 869

I prodotti vanno usati secondo le indicazioni dei produttori!

Avvisiamo inoltre gli olivicoltori che per la difesa degli ulivi si possono usare soltanto i prodotti registrati per la difesa delle piante (SZB).

I dati riguardanti i prodotti registrati per la difesa delle piante nella Repubblica di Croazia sono evidenziati nel Sistema informatico fitosanitario (FIS) che è disponibile al sito web:

<http://fis.mps.hr/trazilicaszb/>

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.