

## Avviso ai viticoltori!

Categoria: Novità

Publicato: Venerdì, 09 Luglio 2021 19:30

Scritto da JUO

Visite: 462



Si consiglia ai viticoltori di continuare ad effettuare la difesa delle loro piantagioni concentrandola contro l'**oidio** (*Erysiphe necator*) e la **peronospora** (*Plasmopara viticola*).

Contro l'oidio consigliamo di usare uno dei seguenti prodotti: **Mystic EC**, **Nativo WG**, **Collis**, **Luna Experience**, **Vivando SC**, **Difcor EC** o qualche altro prodotto che non sia stato usato per più di 3 volte durante la stagione (<http://fis.mps.hr/trazilिकासzb/> )

Contro la peronospora consigliamo di usare uno dei seguenti prodotti: **Galben M**, **Fantic M**, **Acrobat MZ WG**, **Forum star**, **Ridomil Gold MZ Pepite**, **Mildicut Sc** o qualche altro prodotto (<http://fis.mps.hr/trazilिकासzb/>).

In conformità alla Direttiva sull'adozione delle misure atte a prevenire la diffusione e per la soppressione della Flavescenza dorata della vite (GU 48/2018), a tre settimane dal primo intervento va effettuato il secondo trattamento contro il **grillo americano** (*Scaphoideus titanus*), il quale trasmette (vettore) la **Flavescenza dorata della vite** (*Grapevine flavescens doree*) nella **zona delimitata**.

I proprietari di vigneti nella zona delimitata hanno l'obbligo di monitorare la presenza del grillo americano posizionando le apposite placchette appiccicose di colore giallo nelle loro piantagioni, di

## Avviso ai viticoltori!

Categoria: Novità

Publicato: Venerdì, 09 Luglio 2021 19:30

Scritto da JUO

Visite: 462

---

verificare la presenza dei sintomi della malattia e di attuare le misure di protezione.

L'area delimitata comprende l'area infetta (punto focale) che si estende su 1 km di larghezza a partire dal luogo in cui è stata rilevata la presenza della Flavescenza dorata della vite e si estende su un'area di sicurezza dalla larghezza di 5 km a partire dai bordi dell'area infetta.

Per contrastare il grillo americano, in Croazia, sono stati registrati i seguenti insetticidi: **Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Pyregard, Krisant EC e Asset Five.**

**Per proteggere le api, è necessario falciare le superfici fiorite nei vigneti ed effettuare il trattamento nelle ore serali, quando non ci sono api.**

I prodotti vanno usati secondo le indicazioni dei produttori!

Dopo il trattamento va compilata la lista di evidenza per l'uso dei prodotti per la difesa delle piante (SZB)!

Avvisiamo inoltre i viticoltori che per la difesa dei vigneti si possono usare soltanto i prodotti registrati per la difesa delle piante (SZB).

I dati riguardanti i prodotti registrati per la difesa delle piante nella Repubblica di Croazia sono evidenziati nel Sistema informatico fitosanitario (FIS) che è disponibile al sito web:

<http://fis.mps.hr/trazilicaszb/>.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr

[Marina.kocijancic@mps.hr](mailto:Marina.kocijancic@mps.hr)